

*Informácie o používaní, čítajte pozorne!*

## **OCUflash®**

Chlorid sodný 7 mg/ml  
Očná roztoková instilácia

### **1. Čo je OCUflash® a na čo sa používa**

OCUflash® je špeciálny očný (isotonický, pufrovaný) roztok s prídavkom extraktu očianky lekárskej. Je určený pre použitie k výplachom alebo kvapkaniu do oka. Výťažky očianky lekárskej pôsobia v oku protizápalovo, dezinfekčne a adstringentne (sťahujúco). Tieto charakteristické vlastnosti očianky sa už dlhodobo využívajú k upokojeniu očí, k prevencii a k podporenej liečbe neinfekčných zápalov mihalníc a spojoviek.

### **2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete OCUflash®**

OCUflash® sa nesmie používať pri precitlivenosti na niektorú z jeho zložiek.

OCUflash® môžu používať dospelí, deti a mladiství. Vzhľadom k bezpečnosti prípravku je možné ho podávať i novorodencom, dojčatám, tehotným ženám a dojčiacim matkám.

Pokiaľ sú súčasne používané i iné očné instilácie alebo očná masť, je vhodné ich aplikovať do oka najskôr za 5 minút po aplikácii prípravku OCUflash®.

### **3. Ako používať OCUflash®**

OCUflash® je ideálny výplachový roztok pre odstránenie akýchkoľvek cudzích teliesok z oka. Bez rady lekára môže byť použitý k jednoduchému krátkodobému výplachu, ďalej ku kvapkaniu do očí alebo k obkladom mihalníc. Prípravok sa používa pri nepríjemných pocitoch v oku ako je pálenie, rezanie, svrbenie a pocit cudzieho telieska v oku. V praxi je OCUflash® ideálne použiť napríklad:

1. k výplachom oka po tonometrii a gonioskopii,
2. na vymývanie oka, k odstráneniu cudzích teliesok, prachu a chlóranej vody,
3. k odplaveniu zvyškov fluoresceínových roztokov,
4. k vymývaniu hlienistých a hnisavých sekrétov,
5. k výplachom oka po nosení tvrdých kontaktných šošoviek,
6. ako prvá pomoc po ľahkom poleptaní spojoviek a očí kyselinami a zásadami (vápnom, maltou),
7. ako podporný prostriedok pri niektorých, hlavne neinfekčných zápaloch spojoviek, chronických zápaloch spojoviek.
8. je vhodné ho použiť pri odstraňovaní kozmetických prípravkov z okolia oka (viečok, rias).

Dávkovanie:

K upokojeniu očí a k podpornej liečbe neinfekčných zápalov spojoviek a mihalníc vkvapnúť do dolného spojivkového vaku 1-2 kvapky 1-4x denne. Pri výplachu akéhokoľvek cudzieho telieska z oka aplikujeme roztok až do doby odstránenia cudzorodej látky či cudzích teliesok, poprípade do vymiznutia problémov.

Po otvorení je OCUflash® pripravený na podanie do oka. Pacient odskrutkuje ochranný uzáver, mierne zakloní hlavu, obráti fľaštičku hore dnom a stlačením plastickej fľaštičky vkvapne do dolného spojivkového vaku predpísaný počet kvapiek. Množstvo aplikovaného roztoku závisí od spôsobu použitia. Vkvapkajte alebo vypláchnite postihnuté oko roztokom podľa potreby (množstvo vytekajúceho roztoku kontrolujete stlačením fľaštičky). Pri zápaloch mihalníc je možné roztok použiť i k obkladom. Pri aplikácii sa kvapkadlo nemá dotknúť oka ani mihalníc. Nakoniec je nutné uzáver pevne zaskrutkovať, aby sa zabránilo prípadnej kontaminácii. Fľaštička sa uchováva v zvislej polohe.

**Upozornenia:**

OCUflash® neovplyvňuje pozornosť pri riadení motorových vozidiel, obsluhu strojov a práci vo výškach, ktoré vyžadujú zvýšenú pozornosť, avšak pri aplikácii do spojkového vaku môže ojedinele dôjsť prechodne k rozmazanému videniu a preto tieto činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť je možné vykonávať až po ukončení tohto prechodného účinku.

Pri náhodnom požití prípravku dieťaťom kontaktujte lekára.

Pacient nesmie súčasne s používaním prípravku nosiť mäkké kontaktné šošovky (hlavne hydrofilné). Podľa možnosti by sa po dobu liečenia nemali nosiť ani tvrdé kontaktné šošovky, alebo aspoň pred aplikáciou je potrebné, aby si ich pacient vždy vybral a znova nasadil najskôr za 20 minút po nakvapnutí prípravku.

**4. Aké sú možné vedľajšie účinky**

OCUflash® je veľmi dobre znášaný. Zriedkavo sa bezprostredne po aplikácii môže vyskytnúť prechodné mierne pálenie. Môže sa vyskytnúť reakcia precitlivenosti.

**Interakcie:** Nie sú doposiaľ známe.

**5. Čo OCUflash® obsahuje**

Chlorid sodný 7 mg v 1 ml

Pomocné látky: benzalkóniumchlorid 0,04mg v 1ml (0,004%), dihydrát edetanu disodného, chlorid draselný, hexahydrát chloridu horečnatého, polysorbát 80, očianková tinktúra, bórax, hydroxid sodný, voda na injekciu.

**6. Ako uchovávať OCUflash® a ďalšie informácie**

Uchovávajúte pri teplote do 25 °C.

Chrániť pred chladom a mrazom.

Prípravok uchovávajúte mimo dohľadu a dosahu detí.

Prípravok nepoužívajte po dátume expirácie, ktorý je uvedený na štítku alebo na škatuľke pri ikone presýpacích hodín. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Otvorené balenie spotrebujte do 28 dní.

**Balenie:**

1 x 10, 2 x10ml

**Ikona výrobcu**

UNIMED PHARMA spol. s r.o., Oriškova 11, 821 05 Bratislava, Slovenská republika

Tel.: +421 2 4333 3786

Fax: +421 2 4363 8743

e-mail: unimedpharma@unimedpharma.sk

[www.unimedpharma.eu](http://www.unimedpharma.eu)



2265

STERILE A

**Dátum poslednej revízie textu:** Júl 2016